


ORIENTAÇÕES PARA PACIENTES E FAMILIARES

Medicamentos Oncológicos Orais



LETROZOL

Nome do paciente: _____

Data de Nascimento: _____



NotreDame
Intermédica

LETROZOL 2,5mg

M

T

N

Farmacêutico (a): _____

ORIENTAÇÕES DE USO

Como você deve tomar esse medicamento?

- Tomar medicamento conforme prescrição médica, com um copo d'água todos os dias e de preferência no mesmo horário.

Importante: esse medicamento não deve ser partido ou mastigado

- Respeite sempre o mesmo horário, a dose e a duração do tratamento.

O que você deve fazer se esquecer de tomar o medicamento?

- Se você esqueceu de tomar o comprimido de Letrozol, tome a próxima dose no horário habitual.
- Não tome duas doses ao mesmo tempo.

Como guardar esse medicamento?

- Proteger da luz e manter a uma temperatura de 15 a 30 °C, e sempre manter os medicamentos longe do alcance das crianças e de animais.
- Não guardar na cozinha ou no banheiro, pois são lugares muito úmidos e quentes.

REAÇÕES ADVERSAS MAIS COMUNS

Este medicamento pode provocar: edema (Inchaço); sudorese; constipação; diarreia; náusea; artralgia (dor nas articulações); artrite; mialgia (dor muscular); astenia (diminuição da força física; cefaleia (dor de cabeça); insônia; fadiga (cansaço)¹.

Se aparecerem outras reações, consulte o médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Atenção!

Podem ocorrer mudanças como dores musculares; dores nas articulações; dores de cabeça, insônia, fadiga (cansaço).¹

Informe seu médico ou profissional da saúde:

- Se apresentar febre maior que 38°C, calafrios, falta de ar, dispneia após esforço, significativo ganho de peso, edema periférico, náusea, vômito ou diarreia por mais de 24 horas.

Referência: 1 – Bula do medicamento Letrozol.

Descarte:

- As embalagens secundárias dos medicamentos não contaminadas devem ser descartadas como resíduo comum.

